

## Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare Actualizare 10.04.2020

În vederea optimizării activităților de **testare** pentru COVID-19, de **internare** si de **externare**, va rugam sa respectati urmatorul **algoritm**:

### 1. Recomandari de prioritizare a testării pentru COVID-19:

Aceste recomandări au la baza documentul elaborat de Comisia Europeană, pe baza sfatului științific oferit de Centrul European de Control al Bolilor (ECDC).

În aceste conditii strategia trebuie sa fie axată pe **detectarea rapidă a cazurilor** de COVID-19, în vederea **limitării transmiterii**, și pe obținerea de **dovezi** de transmitere comunitară nedetectata.

Astfel, **prioritizarea** testării în ordine **descrescatoare** a importanței este urmatoarea:

1. Persoane **simptomice** cu istoric de călătorie internaționala;
2. Contacti apropiați **simptomici** ai cazurilor confirmate;
3. Personal medico-sanitar **simptomatic**;
4. Cazuri de **pneumonie fara altă etiologie**, din **TOATE** categoriile de varstă și din **TOATE** spitalele;
5. Cazuri de **SARI fara altă etiologie**, din **TOATE** categoriile de varstă și din

**TOATE** spitalele;

6. Persoane instituționalizate **simptomice**
7. Pacienti înainte de procedura de transplant (asimptomatici) si donatorii de celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienti cu transplant de celule stem hematopoietice aflatii in tratament imunosupresor, inaintea fiecărei internari din perioada de monitorizare post-transplant

Categoria de pacienti	Testare imediata	Recomandare internare	Testare ulterioara si externare
1. Persoane <b>simptomice</b> cu istoric de călătorie internațională	<b>DA</b>	Izolare în spital dacă rezultatul este <b>pozitiv</b>	Externarea pacientului se face în conformitate cu criteriile prevăzute în Ordinul nr. 503 din 26 martie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2  Pentru cazurile infirmate, testare pentru alți patogeni respiratori și externare în momentul în care medicul curant consideră că evoluția clinică a pacientului o permite
2. Contacti <b>simptomici</b> ai cazurilor confirmate	<b>DA</b>	Izolare în spital dacă rezultatul este <b>pozitiv</b>	Idem
3. Personal medico-sanitar <b>simptomatic</b>	<b>DA</b>	Izolare în spital dacă rezultatul este <b>pozitiv</b>	Idem
4. Cazuri de <b>pneumonie</b> fără alta etiologie, din TOATE categoriile de vârstă și din TOATE spitalele	<b>DA</b>	Internarea este recomandată pentru toate cazurile de pneumonie.	Idem
5. Cazuri de <b>SARI</b> fără alta etiologie, din TOATE categoriile de vârstă și din TOATE spitalele	<b>DA</b>	Internarea peste noapte face parte din definiția de caz <b>SARI</b> . Ramane în izolare în spital dacă rezultatul este <b>pozitiv</b> .	Idem
6. Persoane instituționalizate <b>simptomice</b>	<b>DA</b>	Izolare în spital dacă rezultatul este <b>pozitiv</b>	Idem
7. Pacienți înainte de procedura de transplant (asimptomici) și donatorii de celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți cu transplant de celule stem hematopoietice aflați în tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare post-transplant	<b>DA</b>	Izolare în spital dacă rezultatul este <b>pozitiv</b>	Idem

Testarea se face **DOAR** la recomandarea medicului, atât în sistemul public, cât și în cel privat de sănătate.

## 2. Categoriile de persoane care NU fac obiectul testării:

Categoria de persoane	Testare	Recomandare	Testare ulterioară
Contacti <b>asimptomatici</b> ai cazurilor confirmate, <b>inclusiv</b> personal medico-sanitar	<b>NU</b>	Auto-izolare la domiciliu 14 zile de la ultimul contact	La apariția <b>simptomatologiei</b> , în decurs de 14 zile de la ultimul contact
Persoane <b>asimptomatice</b> cu istoric de călătorie internațională	<b>NU</b>	Carantina, respectiv auto-izolare la domiciliu timp de 14 zile de la intrarea în țară	La apariția <b>simptomatologiei</b> , în decurs de 14 zile de la intrarea în țară